










# Productos indicados para el tratamiento de la insuficiencia cardiaca en perros

Productos		Principios activos		Indicaciones (perros)	Posología
<b>Diuréticos</b>					
<b>Furosoal</b>	10 mg	Comprimidos masticables	Furose-mida	Tratamiento del hidrotórax, hidropericardio, ascitis y edemas, especialmente los asociados a insuficiencia cardiaca y disfunción renal.	Dosis de inicio recomendada: 2,5-5 mg de furose-mida/kg de peso corporal al día (½-1 comprimido por 2 kg de peso corporal).
	40 mg				Dosis de inicio recomendada: 2,5-5 mg de furose-mida/kg de peso corporal al día (½-1 comprimido por 8 kg de peso corporal).
 <b>Isemid</b>	1 mg	Comprimidos masticables	Torase-mida	Tratamiento de los signos clínicos relacionados con la insuficiencia cardiaca congestiva, incluyendo el edema pulmonar.	Dosis inicial/mantenimiento recomendada: 0,13 a 0,25 mg de torasemida/ kg/día, una vez al día. En caso de edema pulmonar moderado o grave, esta dosis puede aumentarse, en caso necesario, hasta una dosis máxima de 0,4 mg/kg/día una vez al día.
	2 mg				
	4 mg				
<b>Libeo</b>	10 mg	Comprimidos masticables	Furose-mida	Tratamiento de la ascitis y del edema, especialmente asociados con la insuficiencia cardiaca.	De 1 a 5 mg de furose-mida/kg de peso al día, es decir, de ½ a 2,5 comprimidos por cada 5 kg de peso, en una única dosis o dividido en dos dosis al día. Dependiendo de la gravedad del edema o de la ascitis o en los casos refractarios, la dosis diaria puede doblarse.
	40 mg				De 1 a 5 mg de furose-mida/kg de peso al día, es decir, de ½ a 2,5 comprimidos por cada 20 kg de peso, en una única dosis o dividido en dos dosis al día. Dependiendo de la gravedad del edema o de la ascitis o en los casos refractarios, la dosis diaria puede doblarse.
<b>Prilactone Next</b>	10 mg	Comprimidos masticables	Espirono-lactona	Uso en combinación con el tratamiento habitual (incluyendo el uso complementario de un diurético en caso necesario) para el tratamiento de la insuficiencia cardiaca congestiva causada por una valvulopatía mitral degenerativa en perros.	2 mg de espironolactona / kg de peso corporal una vez al día (1 comprimido / 5 kg de peso corporal) por vía oral.
	50 mg				2 mg de espironolactona / kg de peso corporal una vez al día (1 comprimido por cada 25 kg de peso corporal) por vía oral.
	100 mg				2 mg de espironolactona / kg de peso corporal una vez al día (1 comprimido por cada 50 kg de peso corporal) por vía oral.
<b>Upcard</b>	0,75 mg	Comprimidos masticables	Torase-mida	Tratamiento de los signos clínicos, incluyendo edema y derrame relacionados con la insuficiencia cardiaca congestiva.	Dosis recomendada de torasemida: de 0,1 a 0,6 mg / kg de peso, una vez al día. La mayoría de los perros son estabilizados a una dosis de toresamida menor o igual a 0,3 mg / kg de peso, una vez al día.
	3 mg				
	7,5 mg				
<b>IECA</b>					
<b>Arixil Vet</b>	5 mg	Comprimidos recubiertos con película	Hidrocloruro de benazepril	Tratamiento de la insuficiencia cardiaca congestiva.	Perros >5 - 10 kg: 1/2 comprimido Perros >10 - 20 kg: 1 comprimido
	20 mg				Perros >20 - 40 kg: 1/2 comprimido Perros >40 - 80 kg: 1 comprimido
 <b>Banacep Vet</b>	5 mg	Comprimido recubierto con película	Hidrocloruro de benazepril	Tratamiento de la insuficiencia cardiaca congestiva.	Perros >5 - 10 kg: 1/2 comprimido Perros >10 - 20 kg: 1 comprimido
	20 mg				Perros ≥20 - 40 kg: 1/2 comprimido Perros >40 - 80 kg: 1 comprimido
<b>Benakor</b>	5 mg	Comprimidos	Hidrocloruro de benazepril	Tratamiento de la insuficiencia cardiaca congestiva.	Perros >5 - 10 kg: 1/2 (dosis estándar) o 1 comprimido (dosis doble); Perros >10 - 20 kg: 1 (dosis estándar) o 2 comprimidos (dosis doble)
	20 mg				Perros >20 - 40 kg: 1/2 (dosis estándar) o 1 comprimido (dosis doble); Perros >40 - 80 kg: 1 (dosis estándar) o 2 comprimidos (dosis doble)
<b>Benazecare Sabor</b>	5 mg	Comprimidos	Hidrocloruro de benazepril	Tratamiento de la insuficiencia cardiaca congestiva.	Perros 5 - 10 kg: 1/2 (dosis estándar) o 1 comprimido (dosis doble); Perros >10 - 20 kg: 1 (dosis estándar) o 2 comprimidos (dosis doble)
	20 mg				Perros >20 - 40 kg: 1/2 (dosis estándar) o 1 comprimido (dosis doble); Perros >40 - 80 kg: 1 (dosis estándar) o 2 comprimidos (dosis doble)



Productos			Principios activos	Indicaciones (perros)	Posología
<b>Benefortin Sabor</b>	2,5 mg	Comprimidos	Hidrocloruro de benazepril	Tratamiento de la insuficiencia cardiaca congestiva.	Perros 2,5 – 5 kg: 1/2 (dosis estándar) o 1 comprimido (dosis doble); Perros >5 – 10 kg: 1 (dosis estándar) o 2 comprimidos (dosis doble)
	5 mg				Perros >5 – 10 kg: 1/2 (dosis estándar) o 1 comprimido (dosis doble); Perros >10 – 20 kg: 1 (dosis estándar) o 2 comprimidos (dosis doble)
	20 mg				Perros >20 – 40 kg: 1/2 (dosis estándar) o 1 comprimido (dosis doble); Perros >40 – 80 kg: 1 (dosis estándar) o 2 comprimidos (dosis doble)
<b>Bexepril</b>	2,5 mg	Comprimidos recubiertos con película	Hidrocloruro de benazepril	Tratamiento de insuficiencia cardiaca congestiva asociada particularmente a cardiomiopatía dilatada y/o insuficiencia mitral.	Dosis oral recomendada: 0,23 mg de benazepril por kg de peso corporal al día, equivalente a 0,25 mg de hidrocloruro de benazepril por kg de peso corporal al día, administrada de una sola vez.
	5 mg				
	20 mg				
<b>Cardinefril</b>	20 mg	Comprimidos recubiertos con película	Hidrocloruro de benazepril	Perros de más de 20 kg de peso corporal: Tratamiento de la insuficiencia cardiaca congestiva.	Perros >20 – 40 kg: 1/2 (dosis estándar) o 1 comprimido (dosis doble); Perros >40 – 80 kg: 1 (dosis estándar) o 2 comprimidos (dosis doble)
<b>Fortekor Sabor</b>	2,5 mg	Comprimidos	Hidrocloruro de benazepril	Tratamiento de la insuficiencia cardiaca congestiva.	Perros 2,5 – 5 kg: 1/2 (dosis estándar) o 1 comprimido (dosis doble); Perros >5 – 10 kg: 1 (dosis estándar) o 2 comprimidos (dosis doble)
	5 mg				Perros >5 – 10 kg: 1/2 (dosis estándar) o 1 comprimido (dosis doble); Perros >10 – 20 kg: 1 (dosis estándar) o 2 comprimidos (dosis doble)
	20 mg				Perros >20 – 40 kg: 1/2 (dosis estándar) o 1 comprimido (dosis doble); Perros >40 – 80 kg: 1 (dosis estándar) o 2 comprimidos (dosis doble)
<b>Nelio</b>	5 mg	Comprimidos	Hidrocloruro de benazepril	Tratamiento de la insuficiencia cardiaca congestiva.	Perros 2,5 – 5 kg: 1/4 (dosis estándar) o 1/2 comprimido (dosis doble); Perros >5 – 10 kg: 1/2 (dosis estándar) o 1 comprimido (dosis doble); Perros >10 – 15 kg: 3/4 (dosis estándar) o 1+1/2 comprimido (dosis doble); Perros >15 – 20 kg: 1 (dosis estándar) o 2 comprimidos (dosis doble)
	20 mg				Perros >20 – 40 kg: 1/2 (dosis estándar) o 1 comprimido (dosis doble); Perros >40 – 60 kg: 3/4 (dosis estándar) o 1+1/2 comprimidos (dosis doble); Perros >60 – 80 kg: 1 (dosis estándar) o 1+1/2 comprimidos (dosis doble)
<b>Prilben Vet</b>	5 mg	Comprimidos recubiertos con película	Hidrocloruro de benazepril	Tratamiento de la insuficiencia cardiaca congestiva.	Perros >5 – 10 kg: 1/2 (dosis estándar) o 1 comprimido (dosis doble); Perros >10 – 20 kg: 1 (dosis estándar) o 2 comprimidos (dosis doble)
	20 mg				Perros >20 – 40 kg: 1/2 (dosis estándar) o 1 comprimido (dosis doble); Perros >40 – 80 kg: 1 (dosis estándar) o 2 comprimidos (dosis doble)
<b>Vasotop P</b>	0,625 mg	Comprimidos para perros	Ramipril	Para el tratamiento de la insuficiencia cardiaca congestiva (grados de descompensación II, III y IV según la clasificación de la "New York Heart Association - NYHA") causada por una insuficiencia valvular debida a un proceso valvular degenerativo crónico (endocarditis) o a una cardiomiopatía, con o sin terapia complementaria con el diurético furosemida y/o los glicósidos cardíacos digoxina o metildigoxina.	Una dosis única diaria de 0,125 mg de ramipril por kg p.v. (1 comprimido / 5 kg de peso).
	1,25 mg				Una dosis única diaria de 0,125 mg de ramipril por kg p.v. (1 comprimido / 10 kg de peso).
	2,5 mg				Una dosis única diaria de 0,125 mg de ramipril por kg p.v. (1 comprimido / 20 kg de peso).
	5 mg				Una dosis única diaria de 0,125 mg de ramipril por kg p.v. (1 comprimido / 40 kg de peso).
<b>Vetpril</b>	5 mg	Comprimidos recubiertos con película	Hidrocloruro de benazepril	Tratamiento de la insuficiencia cardiaca congestiva en perros de más de 5 kg de peso.	Perros > 5 - 10: 1/2 comprimido Perros > 10 - 20: 1 comprimido
	20 mg				Perros > 20 - 40: 1/2 (dosis estándar) o 1 comprimido (dosis doble); Perros > 40 - 80: 1 (dosis estándar) o 2 comprimidos (dosis doble)
<b>Inodilatadores</b>					
<b>Cardisure Sabor</b>	1,25 mg	Comprimidos	Pimobendan	Para el tratamiento de la insuficiencia cardiaca congestiva canina derivada de una insuficiencia valvular (regurgitación mitral y/o tricúspide) o cardiomiopatía dilatada.	De 0,2 mg a 0,6 mg de pimobendan/kg de peso por día. La dosis diaria preferible es de 0,5 mg de pimobendan/kg de peso. La dosis se ha de dividir en dos administraciones (0,25 mg/kg de peso cada una), la mitad por la mañana y la otra mitad aproximadamente 12 horas después.
	2,5 mg				
	5 mg				
	10 mg				

## Productos indicados para el tratamiento de la insuficiencia cardiaca en perros

Productos			Principios activos	Indicaciones (perros)	Posología
	2,5 mg	Comprimidos masticables	Pimobendan	Tratamiento de la insuficiencia cardiaca congestiva canina causada por una cardiomiopatía dilatada o una insuficiencia valvular (regurgitación de la válvula mitral y/o tricúspide).	La dosis debe administrarse por vía oral y dentro del rango comprendido entre 0,2 mg y 0,6 mg de pimobendán/kg de peso corporal, repartida en dos administraciones diarias. La dosis diaria preferible es 0,5 mg/kg de peso corporal, repartida en dos administraciones diarias (0,25 mg/kg de peso corporal cada una).
	5 mg				
	10 mg				
	1,25 mg	Cápsulas	Pimobendan	Para el tratamiento de la insuficiencia cardiaca congestiva canina originada a partir de una cardiomiopatía dilatada o por una insuficiencia valvular (regurgitación mitral y/o tricúspide).	Se debe administrar a dosis comprendidas entre 0,2 y 0,6 mg de pimobendán/kg peso vivo/día. La dosis diaria preferible es de 0,5 mg de pimobendán/kg peso vivo. La dosis diaria se ha de dividir en dos administraciones (0,25 mg/kg cada una), la mitad de la dosis por la mañana y la otra mitad aproximadamente 12 horas después.
	2,5 mg				
	5 mg				
	0,75 mg/ml	Solución inyectable para perros	Pimobendan	Para iniciar el tratamiento de la insuficiencia cardiaca congestiva canina causada por una insuficiencia valvular (regurgitación de la válvula mitral y/o tricúspide) o cardiomiopatía dilatada.	Inyección única intravenosa a una dosis de 0,15 mg de pimobendán/kg peso corporal (es decir, 2 ml/10 kg peso corporal). Se pueden tratar perros de hasta 25 y 50 kg de peso corporal con viales de 5 y 10 ml, respectivamente. Cada vial es para una administración única. Vetmedin comprimidos masticables o Vetmedin cápsulas para perros pueden utilizarse como continuación al tratamiento, a la dosis recomendada, empezando 12 horas después de la administración de la inyección.
	1,25 mg	Comprimidos	Pimobendan	Tratamiento de la insuficiencia cardiaca congestiva canina causada por una cardiomiopatía dilatada o una insuficiencia valvular (regurgitación de la válvula mitral y/o tricúspide). Tratamiento de la cardiomiopatía dilatada en el estadio preclínico (asintomático con aumento de los diámetros telesistólico y telediastólico del ventrículo izquierdo) en Dóberman Pinschers después del diagnóstico ecocardiográfico de la cardiopatía. Tratamiento de perros con enfermedad mixomatosa de la válvula mitral (EMVM) en fase preclínica (asintomática con soplo mitral sistólico y evidencia de aumento del tamaño del corazón) para retrasar el inicio de los síntomas clínicos de insuficiencia cardiaca.	Debe respetarse un rango de dosificación comprendido entre 0,2 mg y 0,6 mg de pimobendán/kg de peso corporal, repartida en dos administraciones diarias. La dosis diaria preferible es 0,5 mg de pimobendán/kg de peso corporal, repartida en dos administraciones diarias.
	2,5 mg				
	5 mg				
	10 mg				
	1,25 mg	Comprimidos masticables	Pimobendan	Para el tratamiento de la insuficiencia cardiaca congestiva canina causada por una insuficiencia valvular (regurgitación de la válvula mitral y/o tricúspide) o una cardiomiopatía dilatada.	Entre 0,2 mg y 0,6 mg de pimobendán/kg de peso corporal, por día. La dosis diaria preferible es 0,5 mg de pimobendán/kg de peso corporal. La dosis debe repartirse en dos administraciones (0,25 mg/kg peso corporal cada una), usando la combinación más apropiada de mitades de comprimidos y comprimidos enteros. La mitad de la dosis por la mañana y la otra mitad aproximadamente 12 horas después.
	5 mg				
	10 mg				
<b>Combinaciones</b>					
	2,5 mg / 20 mg	Comprimidos	Hidroclo- ruro de benazepril, espiro- nactona	Para el tratamiento de la insuficiencia cardiaca congestiva causada por la enfermedad valvular degenerativa crónica canina (con el uso complementario de un diurético, cuando sea preciso).	Perros 2,5 – 5 kg: 1/2 comprimido Perros 5 – 10 kg: 1 comprimido
	5 mg / 40 mg				Perros 10 – 20 kg: 1 comprimido
	10 mg / 80 mg				Perros 20 – 40 kg: 1 comprimido; Perros 40 – 60 kg: 1 + 1/2 comprimido; Perros 60 – 80 kg: 2 comprimidos
	1,25 mg / 2,5 mg	Comprimidos	Pimobendan, hidroclo- ruro de benazepril	Tratamiento de la insuficiencia cardiaca congestiva canina causada por una insuficiencia de la válvula atrioventricular o una cardiomiopatía dilatada. Únicamente en animales cuyos signos clínicos se controlen mediante la administración de las mismas dosis de los componentes por separado administrados de forma concurrente.	Perros 2,5 – 5 kg: 1/2 comprimido mañana + 1/2 comprimido tarde; Perros 5 – 10 kg: 1 comprimido mañana + 1 comprimido tarde
	5 mg / 10 mg				Perros 10 – 20 kg: 1/2 comprimido mañana + 1/2 comprimido tarde; Perros 20 – 40 kg: 1 comprimido mañana + 1 comprimido tarde; Perros >40 kg: 2 comprimidos mañana + 2 comprimidos tarde

Fuente: CIMAVET. Consultado el 30 de mayo 2023. Medicamentos indicados para la insuficiencia cardiaca en perros, autorizados y comercializados. Tabla elaborada por Grupo Asis Biomedica.